ΚΕΕΛΠΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

**HIV λοίμωξη: νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα, Οκτώβριος 2015**

Η επιδημιολογική επιτήρηση της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα πραγματοποιείται κυρίως μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης των περιστατικών HIV, AIDS και των θανάτων. Η παρακολούθηση της πορείας της επιδημίας αποτελεί έργο του Γραφείου HIV Λοίμωξης και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Σύμφωνα με το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του 2015, έχουν καταγραφεί στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 15.109 περιστατικά HIV λοίμωξης (82,7% άνδρες). Από το σύνολο των ατόμων αυτών, 3.782 έχουν εμφανίσει AIDS και περίπου 7.700 βρίσκονται υπό αντιρετροϊκή θεραπεία. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται στους 2.562.

Τους πρώτους δέκα μήνες του 2015 δηλώθηκαν στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 667 HIV λοιμώξεις (6,2 ανά 100.000 πληθυσμού), εκ των οποίων οι 590 (88,5%) αφορούσαν σε άνδρες και οι 77 (11,5%) σε γυναίκες. Ο αριθμός των περιστατικών το 2015 είναι περίπου ίδιος με αυτόν του 2014 (Σχήμα 1).




**Σχήμα 1.** Δηλώσεις HIV λοίμωξης ανά 100.000 πληθυσμού (περίοδος Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2010-2015).

Την περίοδο 2011-2013 (Πίνακας 1), σημειώθηκε στην Ελλάδα μία σημαντική αύξηση του HIV στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ). Το 2014 και το πρώτο δεκάμηνο του 2015 η πορεία στους ΧΕΝ είναι πτωτική και τα περισσότερα περιστατικά που δηλώθηκαν στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. αφορούσαν σε άτομα που μολύνθηκαν μέσω απροφύλακτης σεξουαλικής επαφής, κυρίως μεταξύ ανδρών. Οι ΧΕΝ που έχουν δηλωθεί ως HIV οροθετικοί το πρώτο δεκάμηνο του 2015 είναι 71 (10,6%), οι άνδρες που είχαν σεξουαλικές επαφές με άνδρες 329 (49,3%) και τα ετεροφυλόφιλα άτομα 100 (15,0%).

**Πίνακας 1.** Περιπτώσεις HIV λοίμωξης με βάση το έτος δήλωσης (Ιανουάριος-Οκτώβριος κάθε έτους) και την κατηγορία μετάδοσης.

| **Κατηγορία μετάδοσης** | **Έτος δήλωσης (1η Ιανουαρίου έως 31η Οκτωβρίου)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Ομο/αμφιφυλόφιλοι άνδρες** | 309 (58,1%) | 332 (40,6%) | 294 (27,8%) | 297 (37,0%) | 332 (48,5%) | 329 (49,3%) |
| **Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών** | 15 (2,8%) | 214 (26,2%) | 514 (48,5%) | 241 (30,1%) | 99 (14,5%) | 71 (10,6%) |
| **Ετεροφυλόφιλοι/ες** | 98 (18,4%) | 145 (17,7%) | 118 (11,1%) | 116 (14,5%) | 120 (17,5%) | 100 (15,0%) |
| **Ακαθόριστοι/ες** | 108 (20,3%) | 123 (15,0%) | 133 (12,6%) | 146 (18,2%) | 134 (19,6%) | 167 (25,0%) |

Συμπερασματικά, στην Ελλάδα, μετά τη μεγάλη επιδημία στους ΧΕΝ την περίοδο 2011-2013, παρατηρείται σημαντική μείωση των περιστατικών HIV λοίμωξης κατά τα δύο τελευταία έτη στη συγκεκριμένη ομάδα. Οι περισσότερες μεταδόσεις του ιού αποδίδονται και πάλι στη σεξουαλική επαφή, κυρίως σε αυτή μεταξύ ανδρών. Τα μηνύματα που προκύπτουν από τα στοιχεία του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης, όσον αφορά στον πληθυσμό των ΧΕΝ, είναι θετικά, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Είναι αναγκαία η ενίσχυση των παρεμβάσεων πρόληψης, τόσο στους ΧΕΝ, όσο και στους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, στους οποίους τα νέα περιστατικά HIV εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα.

Γραφείο HIV & ΣΜΝ